

## R-CHOP療法

(入院)(外来)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	5	21
Rituximab	375mg/m <sup>2</sup>	div	下記		○		
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○		
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	5~10分		○		
PSL	100mg/body	p.o			○→		

day1からの投与間隔 3週間

Rituximab: 生理食塩液または5%ブドウ糖液にて10倍に希釈。

初回投与時: 最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

VCR: 上限2mg/bodyまで

## CHOP療法

(外来)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	3時間		○	
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	1時間		○	

day1からの投与間隔 3週間

## レミケード療法(尋常性乾癬)

(外来)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	15	43	99
レミケード	5mg/kg	div	2時間		○	○	○	○

初回投与後、2週・6週に投与し以後8週間の間隔で投与