

weekly-PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	28
PTX	80mg/m ²	div	1時間		○	○	○		

day1からの投与間隔 4週間

PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
PTX	210mg/m ²	div	3時間		○			

day1からの投与間隔 3週間

DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
DTX	60mg/m ²	div	1時間		○			

day1からの投与間隔 3週間

CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
CPT-11	150mg/m ²	div	1.5時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

CDDP+CPT11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	28
CDDP	80mg/m ²	div	2時間		○				
CPT-11	70mg/m ²	div	2時間		○		○		

day1からの投与間隔 4週間

GEM療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	28
GEM	1000mg/m ²	div	30分		○	○	○		

day1からの投与間隔 4週間

CDDP+GEM療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
CDDP	25mg/m ²	div	2時間		○	○		
GEM	1000mg/m ²	div	30分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

5-FU/I-LV療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36	43	50	56
5-FU	600mg/m ²	div	急速静注		○	○	○	○	○	○			
I-LV	250mg/m ²	div	2時間		○	○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔 8週間

FOLFOX4療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○	○	
5-FU	600mg/m ²	div	22時間		○	○	
I-LV	100mg/m ²	div	2時間		○	○	
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

FOLFOX4+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○	○	
5-FU	600mg/m ²	div	22時間		○	○	
I-LV	100mg/m ²	div	2時間		○	○	
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		
bevacizumab	5(10)mg/kg	div	90分※		○		

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

m-FOLFOX6療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

m-FOLFOX6+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		
bevacizumab	5(10)mg/kg	div	90分※		○		

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

FOLFIRI療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		

day1からの投与間隔 2週間

FOLFIRI+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		
bevacizumab	5(10)mg/kg	div	90分※		○		

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

m-FOLFOX6+panitumumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		
panitumumab	6mg/kg	div	60分		○		

day1からの投与間隔 2週間

FOLFIRI+panitumumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		
panitumumab	6mg/kg	div	60分		○		

day1からの投与間隔 2週間

cetuximab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22
cetuximab	400mg/m ²	div	2時間		○									
//	250mg/m ²	div	1時間			○	○	○

初回のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m² 毎週投与

cetuximab+CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36	43	50	・	・
cetuximab	400mg/m ²	div	2時間		○									
〃	250mg/m ²	div	1時間			○	○	○	○	○	○	○	・	・
CPT-11	100mg/m ²	div	90分		○	○	○	○			○	○	・	・

cetuximabは初回のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m² 毎週投与
day1からの投与間隔 6週間

S1+CDDP療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	22	29	35
S1	80mg/m ²	p.o			○	→					
CDDP	60mg/m ²	div	2時間			○					

day1からの投与間隔 5週間

S1はday1～day21 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後14日間休薬する。

FP(5-FU+CDDP)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	6	7
5-FU	800mg/m ²	div	24時間		○	○	○	○	○		
CDDP	80mg/m ²	div	2時間		○						

day1からの投与間隔 1週間

FEC100(5-FU+EPI+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
EPI	100mg/m ²	div	15分		○			
5-FU	500mg/m ²	div	15分		○			
CPA	500mg/m ²	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

FEC75(5-FU+EPI+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
EPI	75mg/m ²	div	15分		○			
5-FU	500mg/m ²	div	15分		○			
CPA	500mg/m ²	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

EC(EPI+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
EPI	75～90mg/m ²	div	15分		○			
CPA	600mg/m ²	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

AC (DXR+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
DXR	60mg/m ²	div	15分		○			
CPA	600mg/m ²	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

weekly-trastuzumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22
trastuzumab	4mg/kg	div	90分		○									
"	2mg/kg	div	30分※			○	○	○

初回のみ4mg/kg、2回目以降は2mg/kg 毎週投与
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

trastuzumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
"	6mg/kg	div	30分※			○	

初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

trastuzumab+PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
"	6mg/kg	div	30分※			○	
PTX	175mg/m ²	div	3時間		○	○	

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

trastuzumab+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
"	6mg/kg	div	30分※			○	
DTX	60mg/m ²	div	1時間		○	○	

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

trastuzumab+VNR療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	21	22	29
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○				
"	6mg/kg	div	30分※					○	
VNR	20~25mg/m ²	div	5分		○	○		○	○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

VNR療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	21
VNR	20~25mg/m ²	div	5分		○	○	

day1からの投与間隔 3週間

trastuzumab+weekly-PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○			
"	6mg/kg	div	30分※					○
PTX	80mg/m ²	div	1時間		○	○	○	

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

panitumumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	15	28
panitumumab	6mg/kg	div	60分		○	○	

day1からの投与間隔 4週間

weekly-PTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
PTX	100mg/m ²	div	1時間		○	○	○	
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○	○		

day1からの投与間隔 4週間
 ※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
eribulin	1.4mg/m ²	div	5分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

trastuzumab + eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○				
"	6mg/kg	div	30分※					○	
eribulin	1.4mg/m ²	div	5分		○	○		○	○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

TC (DTX+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
DTX	75mg/m ²	div	1時間		○			
CPA	600mg/m ²	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

CPT-11+panitumumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		
panitumumab	6mg/kg	div	60分		○		

day1からの投与間隔 2週間

SOX + bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
L-OHP	130mg/m ²	div	2時間		○		
S1	120mg/body	p.o			○ →		

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能
 S1はday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

SOX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
L-OHP	130mg/m ²	div	2時間		○		
S1	120mg/body	p.o			○ →		

day1からの投与間隔 3週間

S1はday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

XP (XELODA+CDDP) 療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	14	21
ゼローダ	2000mg/m ² /day	p.o		○	→	
CDDP	80mg/m ²	div	2時間	○		

day1からの投与間隔 3週間

ゼローダはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

Kadcyla療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	8	15	21
Kadcyla	3.6mg/kg	div	90分	○			

day1からの投与間隔 3週間

初回は90分、2回目以降は30分に投与時間短縮可能

Ram(サイラムザ) + PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	8	15	28
Ram	8mg/kg	div	1時間	○		○	
PTX	80mg/m ²	div	1時間	○	○	○	

day1からの投与間隔 4週間

Ram(サイラムザ) 療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	14
Ram	8mg/kg	div	1時間	○	

day1からの投与間隔 2週間

pertuzumab+trastuzumab+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	21	22
pertuzumab	840mg/body	div	1時間	○		
"	420mg/body	div	1時間			○
trastuzumab	8mg/kg	div	90分	○		
"	6mg/kg	div	30分※			○
DTX	75mg/m ²	div	1時間	○		○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

pertuzumab+trastuzumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	21	22
pertuzumab	840mg/body	div	1時間	○		
"	420mg/body	div	1時間			○
trastuzumab	8mg/kg	div	90分	○		
"	6mg/kg	div	30分※			○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

trastuzumab+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36
trastuzumab	4mg/kg	div	90分		○					
"	2mg/kg	div	30分※			○	○	○	○	○
DTX	75mg/m ²	div	60分		○		○			

trastuzumabは初回のみ4mg/kg、2回目以降は2mg/kg

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

nabPTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
nabPTX	260mg/m ²	div	30分		○			
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○			

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

weekly nabPTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
nabPTX	100mg/m ²	div	30分		○	○	○		
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○	○			

day1からの投与間隔 4週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

DCF療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	21
DTX	70mg/m ²	div	60分		○					
CDDP	70mg/m ²	div	2時間		○					
5-FU	750mg/m ²	div	24時間		○	○	○	○	○	

day1からの投与間隔 3週間

FOLFIRI+Ram(サイラムザ)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		
Ram	8mg/kg	div	60分		○		

day1からの投与間隔 2週間

DCS療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	14	28
DTX	40mg/m ²	div	60分		○		
CDDP	60mg/m ²	div	2時間		○		
S1	80~120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 4週間

S1はday1夕~day15朝まで内服、その後14日間休薬する。

FOLFIRINOX療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	180mg/m ²	div	90分		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

FOLFOXIRI療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	3200mg/m ²	div	48時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	165mg/m ²	div	1時間		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

FOLFOXIRI+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	2	14
bevacizumab	5mg/kg	div	90分※		○		
5-FU	3200mg/m ²	div	48時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	165mg/m ²	div	1時間		○		
L-OHP	85mg/m ²	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

nivolumab (オプジーボ) 療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	8	14
nivolumab	240mg/body	div	30分以上		○		

day1からの投与間隔 2週間

nabPTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
nabPTX	100mg/m ²	div	30分		○	○	○		

day1からの投与間隔3～4週間

pertuzumab+trastuzumab+eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	21
pertuzumab	420mg/body	div	1時間		○		
trastuzumab	6mg/kg	div	30分		○		
eribulin	1.4mg/m ²	div	5分		○	○	

投与間隔 3週間

pertuzumab+trastuzumab+DTX療法無効例に対する治療

VNR+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
VNR	25mg/m ²	div	15分		○			
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○			

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

FOLFIRI+AFL(サルトラップ)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	14
5-FU	400mg/m ²	div	急速静注		○		
5-FU	2400mg/m ²	div	46時間		○	○	
I-LV	200mg/m ²	div	2時間		○		
CPT-11	150mg/m ²	div	90分		○		
AFL	4mg/kg	div	60分		○		

day1からの投与間隔 2週間

dose-densePTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
PTX	175mg/m ²	div	3時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

nabPTX+Ram療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
nabPTX	100mg/m ²	div	30分		○	○	○	
Ram	8mg/kg	div	60分		○	○		

day1からの投与間隔 4週間

XELIRI+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
CPT-11	200mg/m ²	div	90分		○		
ゼロータ	1600mg/m ² /day	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能
ゼロータはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

5-FU+MMC+RT療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	28
5-FU	800mg/m ²	div	24時間		○	○	○	○	
MMC	10mg/m ²	div	30分		○				

day1からの投与間隔 4週間

TAS102+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	5	8	12	15	28
bevacizumab	5mg/kg	div	90分		○					○
TAS102	35mg/m ²	p.o			○	→		○	→	

day1からの投与間隔 4週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能
TAS102はday1～5、day8～12 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後14日間休薬する。

GCS療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	7	14
GEM	1000mg/m ²	div	30分		○		
CDDP	25mg/m ²	div	1時間		○		
S1	80～120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 2週間

S1はday1～7まで内服、その後7日間休薬する。

bevacizumab+eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	21
bevacizumab	15mg/kg	div	90分		○		
eribulin	1.4mg/m ²	div	5分		○	○	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

MTX+AraC髄注療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1
MTX	20mg/body	髄注	5分		○
AraC	15mg/body	髄注	5分		○
PSL	20mg/body	髄注	5分		○

day1からの投与間隔 3週間

S1 + bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
S1	80mg/m ²	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能
S1はday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

CPT11 + bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14
bevacizumab	5mg/kg	div	90分		○	
CPT11	150mg/m ²	div	90分		○	

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

nabPTX+Atezolizumab (テセントリク)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
nabPTX	100mg/m ²	div	30分		○	○	○	
テセントリク	840mg/body	div	60分		○		○	

day1からの投与間隔 4週間